সংবাদ বিজ্ঞপ্তি কঠোৰ লেঞ্চেট এম্বাৰ্গো: বৃহস্পতিবাৰ, 21 অক্টোবৰ 2010, 04.31 বজাত নতুন দিল্লী সময়

বৃহস্পতিবাৰ, 21 অক্টোবৰ 2010, 00.01 বজাত লণ্ডন সময়

বুধবাৰ, 20 অক্টোবৰ 2010, 19.01 বজাত টৰণ্টো সময়

নতুন গৱেষণাই ভাৰতত প্ৰতি বছৰে 200 হাজাৰ পৰিহাৰ্য্য মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যু আৱিষ্কাৰ কৰিছে

নতুন দিল্লী, ভাৰত - ভাৰত, কানাডা আৰু ইংলণ্ডৰ গৱেষকৰ দল এটাৰ এক নতুন অধ্যয়ন অনুসৰি, ভাৰতত মেলেৰীয়াৰ ফলত হোৱা অকাল মৃত্যুৰ সংখ্যা ইমান দিনে অতি কমকৈ অনুমান কৰা হৈ আহিছে।

যিহেতু মেলেৰীয়া সহজে আৰু কম খৰচতে আৰোগ্য কৰিব পৰা যায়, সঠিকভাৱে নিদান হোৱা মেলেৰীয়া ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত কৰা জৰীপৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা ভুলকৈ অতি কম যেন দেখা যায়। বেছিভাগ মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যু গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত হয়, যাৰ হঠাতে জ্বৰ হয় আৰু কোনো স্বাস্থ্য কৰ্মীৰ সেৱা লাভ নকৰে।

এই নতুন অধ্যয়নটি ভাৰতত যিকোনো কাৰণতে মৃত্যু হোৱা এক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব মূলক নমুনাৰ ওপৰত কৰা হৈছে, য'ত পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক মৃত্যুৰ কাৰণ হোৱা ৰোগটোৰ বৰ্ণনা দিবলৈ কোৱা হৈছিল। ইয়াৰ ফলাফলে দেখুৱায় যে মেলেৰীয়াৰ ফলত ভাৰতত 70 বছৰ বয়সৰ আগত প্ৰায় 200 হাজাৰ (2 লাখ) লোকৰ অকাল মৃত্যু হয় (ইয়াৰ ভিতৰত আছে 80 হাজাৰ 15 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 120 হাজাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোক)। মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুৰ ইয়াৰ আগৰ অনুমানবোৰ এই নতুন সংখ্যাৰ 10% ৰো কম আছিল।

“এই সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে, এইডছ বা কৰ্কট ৰোগৰ বিপৰীতে, সময়মতে চিকিত্সা কৰিলে মেলেৰীয়া ৰোগ আৰোগ্য কৰিব পাৰি,” স্বাস্থ্য গৱেষণা বিভাগৰ সচিব তথা ভাৰতীয় চিকিত্সা অনুসন্ধান পৰিষদৰ মহানিৰ্দেশক ডাঃ ভিএম কাটোচ্ছে কয়। “আমাৰ হাতত সুৰক্ষিত, আৰু কম-খৰচী দৰৱ আছে যি দ্ৰুতগতিত মেলেৰীয়া ৰোগীক আৰোগ্য কৰিব পাৰে। আমাক প্ৰয়োজন হৈছে দ্ৰুত সহজলভ্য স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা”।

এই ফলাফলবোৰ আহিছে ভাৰতৰ সকলো মৃত্যুৰ কাৰণৰ ওপৰত কৰা প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰজোৰা প্ৰতিনিধিত্ব মূলক নমুনাৰ জৰীপৰ পৰা। এই গৱেষণাটো, যাক ভাৰতৰ মহাৰেজিষ্টাৰৰ কাৰ্য্যালয়, আৰু চেণ্ট মাইকেলছ হস্পিটালৰ চেণ্টাৰ ফৰ গ্লোবেল হেল্থ ৰিচাৰ্ছ (চিজিএইচআৰ) তথা কানাডাৰ টৰোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দলসমূহৰ নেতৃত্বত কৰা হৈছিল, আজি (অক্টোবৰ 21, 2010) ইংলণ্ডৰ এক মূখ্য চিকিত্সা জাৰ্ণেল, দি লেঞ্চেট-ত অনলাইন ভাৱে প্ৰকাশিত কৰা হৈছে।

“ই হৈছে প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰজোৰা অধ্যয়ন য’ত গোটেই ভাৰতৰ লোকসকলৰ পৰা মৃত্যুৰ কাৰণৰ তথ্য পোনপটীয়াকৈ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। ই দেখুৱায় যে মেলেৰীয়াই আগতে অনুমান কৰাতকৈ অতি বেছি সংখ্যক লোকৰ প্ৰাণ লয়। ইয়াৰে বেছিভাগ মৃত্যু সেইকেইখন ভাৰতীয় ৰাজ্যত হয় য’ত মেলেৰীয়া জীৱাণুৰ অতি বিপদজনক প্ৰকাৰটো সচৰাচৰ পোৱা যায়,” চিজিএইচআৰ-ৰ নিৰ্দেশক আৰু সহ-ৰচক প্ৰফ. প্ৰভাত ঝা-ই কয়।

ভাৰতৰ ৰাজ্য উৰিষ্যাত আন যিকোনো ৰাজ্যতকৈ অধিক মেলেৰীয়া-জনীত মৃত্যু হয়, প্ৰতি বছৰে 50 হাজাৰ। আন “অত্যাধিক-মেলেৰীয়া” গ্ৰস্ত ডাঙৰ ৰাজ্যকেইখন হৈছে চট্টিছগড়, ঝাড়খণ্ড আৰু অসম, এইকেইখনো পূৱ ভাৰতৰ।

এই অধ্যয়ন 6671 টা অঞ্চলত কৰা হৈছিল, প্ৰত্যেকতে প্ৰায় 200 ঘৰ গৃহস্থ ধৰি। এই অঞ্চলবোৰক গোটেই ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ ক্ৰম বিহীন ভাৱে বাচনি কৰা হৈছিল। ইয়াত, 800 ক্ষেত্ৰ কৰ্মীয়ে 2001-2003 ৰ ভিতৰত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ 122 হাজাৰ পৰিয়ালৰ সাক্ষাত্ লৈছিল, য’ত তেওঁলোকক মৃত্যুৰ সৈতে জৰিত লক্ষণ আৰু পৰিস্থিতি সমূহ বৰ্ণনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল। তাৰ পিছত এই পৰিয়ালবোৰৰ লিখিত প্ৰতিবেদনবোৰ প্ৰত্যেকৰে মৃত্যুৰ সম্ভাব্য কাৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ কমেও দুজন চিকিত্সকৰ দ্বাৰা স্বাধীনভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল।

শেষত পৰীক্ষকসকল এই সিদ্ধান্তত উপনীত হয় যে 1 মাহৰ পৰা 70 বছৰ বয়সৰ মাজত হোৱা মৃত্যুৰ প্ৰায় 4%-ৰ সম্ভাব্য কাৰণ হৈছে মেলেৰীয়া। এই অনুপাতৰ বয়সৰ সৈতে তাৰতম্য হোৱা দেখা গৈছিল (জীৱনৰ প্ৰথম মাহত 0%,

পিছৰ শিশুকালত 6% আৰু প্ৰাপ্তবয়সকৰ ক্ষেত্ৰত 3%)। প্ৰত্যেকে বয়সৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিসংখ্যাৰ পৰা গোটেই ভাৰতত যিকোনো কাৰণত হোৱা মৃত্যুৰ বাৰ্ষিক সংখ্যা জনা যায়, এই অধ্যয়নৰ পৰা মেলেৰীয়াৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ শতাংশ জনা গৈছে, আৰু এই দুয়োটাক একেলগ কৰিলে মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংখ্যা প্ৰাপ্ত হয়।

সামগ্ৰীক ভাৱে, প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 200 হাজাৰ (2 লাখ) অকাল মৃত্যুৰ কাৰণ মেলেৰীয়া বুলি জনা গৈছে। মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুবোৰৰ ভিতৰত, 90% মৃত্যু গ্ৰাম্য অঞ্চলত হৈছিল আৰু 86% কোনো ধৰণৰ চিকিত্সা অবিহনে ঘৰতে হৈছিল।

লগতে প্ৰকাশিত এক সম্পাদকীয়ত, ডাঃ চিমন হে, অক্সফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলেণ্ড আৰু মেলেৰীয়া এটলাছ প্ৰজেক্টৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক-এ ব্যাখ্যা কৰে কেনেদৰে হয়তো আগতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনে গ্ৰহণ কৰা মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুৰ সংখ্যা 15 হাজাৰৰ ভিতৰত সেই বেছিভাগ মৃত্যু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাছিল য’ত ৰোগ হঠাতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনো স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ চিকিত্সা প্ৰাপ্ত কৰা নাছিল।

তেওঁ লগতে কয় যে, যিহেতু ভাৰতত বেছিভাগ মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যু যিকোনো স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা অতি দূৰত হয়, “মেলেৰীয়াৰ পৰা হোৱা মৃত্যু বোৰ সাধাৰণতে স্বাস্থ্য প্ৰতিবেদন প্ৰণালীৰ বাবে অদৃশ্য হৈ থাকে।”

অধ্যয়নৰ ৰচক সকলে শেষত মন্তব্য দিয়ে: “যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যু, বা বিশ্বজুৰি প্ৰাপ্তবয়সক সকলৰ মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুৰ সংখ্যা অতি কমকৈ অনুমান কৰা হৈছে, ই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ ৰণনীতিবোৰৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ৰাজ্যবোৰৰ মেলেৰীয়াৰ উচ্চ প্ৰকোপ থকা গ্ৰাম্য অঞ্চলসমূহৰ বাবে।” তেওঁলোকে লগতে পৰামৰ্শ দিয়ে যে ভাৰত, আফ্ৰিকা আৰু অন্যান্য ঠাইত মেলেৰীয়াৰ পৰিমাণ উন্নত ভাৱে নিৰূপণ কৰিলে শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়সকৰ বাবে সমূহীয়া চিকিত্সা সহজলভ্য কৰিবলৈ অধিক যুক্তিসঙ্গত আধাৰ প্ৰদান কৰিব পাৰে।

ষ্টেনফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতিৰ অধ্যাপক আৰু 1972 চনৰ অৰ্থনীতিৰ নোবেল বটা বিজয়ী কেনেথ জে. এৰো-য়ে কয় যে “আৰ্টেমেছিনিন মিশ্ৰ চিকিত্সাবোৰ অত্যাধিক ফলপ্ৰসূ আৰু ‘মেলেৰীয়াৰ বাবে সহজলভ্য দৰৱ’ কাৰ্য্যসূচীৰ যোগেৰে ইয়াক উপলব্ধ কৰাব পৰা যায়। এই চিকিত্সা শিশু আৰু প্ৰাপ্তবয়সকৰ বাবে ৰাজহুৱা আৰু/বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিতৰণ প্ৰণালীৰ দ্বাৰা সহজে প্ৰাপ্য কৰোৱা উচিত।”

গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাসমূহ:

- ভাৰতৰ সকলো মৃত্যুৰ কাৰণৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব মূলক নমুনা;
- 1 মাহৰ পৰা 70 বছৰ বয়সৰ মাজত হোৱা 75 342 মৃত্যুৰ ভিতৰত, 2681 (3.6%) মেলেৰীয়া জ্বৰৰ বাবে হোৱা বুলি অনুমান কৰা হৈছে;
- সেয়েহে, ভাৰতত সামগ্ৰীকভাৱে 70 বছৰ বয়সৰ আগতে মেলেৰীয়াৰ পৰা নিশ্চয় 200 হাজাৰ (2 লাখ) লোকৰ মৃত্যু হয়, যি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনৰ আগৰ অনুমান সকলো বয়সৰ বাবে 15 হাজাৰতকৈ যথেষ্ট বেছি;
- এই মেলেৰীয়া-জনীত মৃত্যুবোৰৰ ভিতৰত, 55 হাজাৰ আগতীয়া শিশুকালত, 30 হাজাৰ 5-14 বছৰৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু 120 হাজাৰ (1.2 লাখ) 15-69 বছৰ বয়সৰ লোকৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিল;
- আগতীয়া শিশুকাল আৰু পিছৰ মধ্য বয়সত মৃত্যুৰ হাৰ বেছি আছিল;
- 90% মেলেৰীয়া-জনীত মৃত্যু গ্ৰাম্য অঞ্চলত হৈছিল আৰু 86% কোনো ধৰণৰ চিকিত্সা অবিহনে ঘৰতে হৈছিল;
- মেলেৰীয়া-জনীত মৃত্যুৰ আধা পূব ভাৰতৰ কেইখনমান উচ্চ-মেলেৰীয়া ৰাজ্যতেই হৈছিল (উৰিষ্যা, চট্টিছগড়, ঝাড়খণ্ড, অসম আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ);
- বৰ্তমানৰ মেলেৰীয়া মৃত্যুৰ হাৰ অনুসৰি, এক গড় ভাৰতীয় শিশুৰ 70 বছৰ বয়সৰ আগতে মেলেৰীয়াৰ ফলত মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা 2% (মৃত্যুৰ আন কোনো কাৰণ নাই বুলি ধৰি), কিন্তু এই বিপদাশংকাৰ হাৰ উচ্চ-মেলেৰীয়া ৰাজ্য কেইখনত যথেষ্ট বেছি;
- ভাৰতীয় মেলেৰীয়া নিয়ন্ত্ৰণ কাৰ্য্যসূচীয়ে সৰ্বাধিক বিপদজনক প্ৰকাৰৰ মেলেৰীয়া জীৱাণুৰ (প্লাজমোডিয়াম ফেলচিপেৰাম) আটাইতকৈ বেছি প্ৰকোপ থকা বুলি গম পোৱা ৰাজ্য সমূহত মেলেৰীয়া জনীত মৃত্যুবোৰ হৈছিল, কিন্তু এই ৰাজ্য বোৰত মেলেৰীয়া বুলি ভুল হব পৰা আন কোনো বিশেষ ৰোগৰ উচ্চ প্ৰকোপ নাই।
-

ভাৰতীয় আৰু পশ্চিমীয়া সংখ্যাৰ ওপৰত টোকা: 1 লাখ =100 হাজাৰ

ভাৰতত প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশুৰ মেলেৰীয়া-জনিত মৃত্যুৰ হাৰ: এক ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৱে প্ৰতিনিধিত্বি মূলক মৃত্যুৰ হাৰৰ জৰীপ। ডি লেন্চেট, 21 অক্টোবৰ 2010, DOI: S0140-6736(10)60831-8*(www.thelancet.com)*

অধিক তথ্য

উত্তৰ আমেৰিকান সংবাদ মাধ্যম (প্ৰফ. প্ৰভাত ঝা-ৰ বাবে): শ্ৰীমতি এঞ্চেলা ৱং, ম'বাইল (+1) 416 662 1347, ই-মেইল wongans@smh.ca

ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যম: শ্ৰীমতি প্ৰভা চটি (প্ৰফ. প্ৰভাত ঝা-ৰ বাবে), টেলিফোন (+91) 971 196 4550, ই-মেইল satip@smh.ca

ডঃ বিনোদ পি. শৰ্মা, ম'বাইল (+91) 981 070 6411 বা ই-মেইল vinodsharma1938@gmail.com

ইউকে আৰু ইউৰোপীয় সংবাদ মাধ্যম (প্ৰফ. চাৰ ৰিচাৰ্ড পেটো ৰ বাবে): অক্সফ'ৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰেছ অফিছ, টেলিফোন (+44) 1865 280530, ই-মেইল press.office@admin.ox.ac.uk বা ই-মেইল Richard.Peto@ctsu.ox.ac.uk

গৱেষণা পত্ৰখন, ভাৰতীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহত প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি, এক ভিডিঅ' সংবাদ মুক্তি (ভাৰতীয় আঞ্চলিক ভাষাসমূহৰ সংস্কৰণ সহ), বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক সকলৰ টিপ্পনীসমূহ, সততে সোধা প্ৰশ্নসমূহ, আৰু মূখ্য ফলাফলবোৰৰ পাৱাৰপইণ্ট শ্লাইড **www.cghr.org/malaria**-ত উপলব্ধ 21 অক্টোবৰ 2010, পৰা ।

নতুন দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰ, 21 অক্টোবৰত 11.30 ৰ পৰা 13.30 লৈ তাজ মহল হোটেল, 1 মানসিংহ ৰোডত এম্বাৰ্গো দ সংবাদ মেলে: আমন্ত্ৰণৰ বাবে, শ্ৰীমতি প্ৰভা চটিৰ সৈতে (+91) 971 196 4550-ত যোগাযোগ কৰক।

(সমাপ্ত)